

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA,
DE

SINGULTU

PRÆCIPUE PUERPERARUM,

Quam

AUSPICE DEO PROPITIO,
Et Consensu atque Auctoritate Gratiſſæ Facultatis Medicæ,
IN ALMA REGIA FRIDERICIANA,
PRÆSIDE

DN. D. MICHAELE ALBERTI,

SACR. MAJ. REG. BORUSS. AULICO ET CONSIST. MAGDEB.
CONSILIARIO, MED. ET PHILOS. NATUR. PROFESSORE
PUBLICO ORDINARIO, ETC.

DECANO H. T. SPECTATISSIMO,

Domino Patrono, Præceptore ac Promotore suo, omni honoris cultu prosequendo,

PRO GRADU DOCTORIS

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS DO-
CTORALIBUS LEGITIME IMPETRANDIS,

horis locoque consuets

ANNO MDCCXXXVIII.

Publicæ ac placidæ Eruditorum ventilationi subjiciet

AUCTOR

HENRICUS AUGUSTUS HERTZOG,

AURIC. FRISIUS.

HALÆ MAGDEBURGICÆ,
TYPIS JO. CHRISTIANI HENDELII, ACAD. TYPOGR.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

BY THE BOARD OF TRUSTEES

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO

V I R O
AMPLISSIMO, CONSULTISSIMO
ATQUE EXPERIENTISSIMO DOMINO
D O M I N O
CHRISTIANO SIGIS-
MUNDO RICHTER,
SERENISSIMI PRINCIPIS
ANHALTINO-COTHONIENSIS
CONSILIARIO AULICO SPECTATISSIMO
MEDICINÆ DOCTORI CELEBERRIMO,
DEXTERRIMO,
RELIQUA.

AVUNCULO AC PATRONO
OMNI HONORIS ET AMORIS CULTU PRO-
SEQUENDO,

D. D. D.

A U C T O R.

VIR AMPLISSIME CONSULTISSIME

ATQUE EXPERIENTISSIME

*AVUNCULE ET PATRONE OMNI HONORIS ET
AMORIS CULTU PROSEQUENDE!*

Offero TIBI, ea qua par est observantia
& devincto animo, paucas hasce plagu-
las, speciminis academici loco, quod
exhibendum erat, conscriptas, & primi-
tias studiorum meorum continentes. Et enim
quando præteritorum reminiscor temporum,
nunquam non intimo animi affectu & grata re-
cordatione contemplor, quanta benevolentia,
quamque paterno plane amore, post tristissima
fata, quæ parentes meos dilectissimos, ex hac
evanida vita abstulerunt, semper me amplexus
atque

atque prosequutus sis. Non enim solum quam primum, quinque abhinc annis, ad hanc Academiam appuleram, consilio & auxilio mihi adfui, quo curriculum studiorum meorum rite instituerem, sed etiam post ea omnem Tuam eo direxisti curam, ut idem absque vel ullo impedimento absolvere & ad finem usque feliciter perducere possem. Postquam igitur per Dei gratiam ad exoptatum hunc studiorum terminum perveneram, ipse mihi autor suasorque fuisti, ut a gratiosa facultate Medica, summos in arte salubri honores atque privilegia peterem, quo ea quæ hætenus didiceram ad ipsam praxin reducere mihi liceret. Quæ cum omnia TIBI unice debeam, omnino conveniebat, TIBI studiorum meorum rationem reddere & hanc Dissertationem TUO AMPLISSIMO NOMINI inscribere atque consecrare. Accipe itaque VIR AMPLISSIME hanc reverentiæ, observantiæ & obstricti animi tesseram, ea qua soles serena fronte, & quamvis Tua in me collata beneficia nunquam compensare queam, ad minimum hoc gratitudinis qualecunque signum benevole suscipe. Ipse Deus Optimus Maximus ad sit TIBI sua clementia, restituat TIBI sanitatem hætenus infirmam & vacillantem, augeat TIBI annos atque vires cum perenni bona valetudine stipatas, annuat

nuat consiliis Tuis, quæ pro salute multorum æ-
grorum capis, arceat a Te omnia pericula, &
quacunque benedictione & prosperitate TE ac-
cumulet. Vale & impofterum Tuo Patrocinio
fave

VIR AMPLISSIME CONSULTISSIME


ATQUE EXPERIENTISSIME

***AVUNCULE ET PATRONE OMNI HONORIS ET
AMORIS CULTU PROSEQUENDE***

TUI NOMINIS

Observantissimo cultori

HENR. AUG. HERTZOG.



PRAEFATIO.



Uod facundissimus C I C E R O in *Quæst. Academ. 4.* præclare disse-
ruit: *esse animorum ingeniorumque
nostrorum naturale quoddam quasi
pabulum, consideratio contemplatio-
que naturæ: & indagationem ipsam
rerum magnarum occultarumque
habere oblectationem;* id certe omnes experiuntur, qui
arti Medicæ operam navantes, naturæ & corporis
humani afflictiones, earumque abditas causas accu-
ratus rimari atque scrutari student. Quemadmo-
dum enim in toto terrarum orbe, nihil vita præstan-
tius nihilque sanitate jucundius: tanto magis naturali
quasi instinctu adigimur, ad ea indaganda, quæ vi-
tæ & sanitati nostræ damnum & detrimentum affe-
runt. Quare & plebeji ac infimæ fortis homines, hoc
vel alio morbo laborantes, non raro Medicum lacef-
fere solent & suis agitare quæstiunculis: Herr Doctor
woher komt mir doch das ic. desiderantes, ut vel minu-
tissima ipsis explicentur, quarum ratio tamen non
semper in promptu, sed diligenti & crebra prius ob-
serva-

fervatione, & maturiore pensiculatione elicienda est. Ne mirare itaque benevole Lector, qui factum sit, ut hanc de Singultu Puerperarum Dissertationem conscriberem, nec puta quasi me fugiat, quod de Singultu passim in libris Medicis & alibi jamjam scripta quædam prostant; sed firmiter tibi velim persuadeas, me non sine ratione sufficienti hunc laborem sat arduum suscepisse. Ut enim non dicam, quantum in rebus occultis & abstrusis, quæ ad naturam humanam spectant, indagandis, sentiam oblectamenti & voluptatis, primo haud silentio præterire possum, quod nunquam de hac specie singultus ullibi seorsim quidquam legerim; deinde non præter videndus erat ille, quorarior est, casus notabilis, quo singultum in puerpera quadam ipse observavi, quemque infra plurimis enarrabo; tandem non debebam oblivisci, quod ipse sæpius singultu correptus fuerim. Cum itaque hæc jam ante aliquod tempus me impulerant, ut horis subsecivis altiori scrutinio hanc rem committerem, & ex principiis Physiologicis, Anatomicis & Physicis, ratiocinatione hujus affectus causas eruere conarer, videbam meam sententiam auctoritate summorum virorum, quorum scriptis in hac commentatione usus sum, confirmari. Hinc operæ pretium putabam hæc meditationes meas, instar speciminis profectuum, quod ex legum præscripto dandum est, publici juris facere & placido eruditorum examini submittere, quo alii judicare possint, quid in hac re præstiterim. Te igitur benevole Lector rogo, ut hæc quæliacunque sint, æquo animo excipere, & si quæ minus recte, ad mentem tuam, posita sunt, imbecillitati virium mearum condonare velis.

§. I.

QUum in præsentiarum singultum, in specie puerperarum, pro argumento & fundamento dissertationis meæ elegerim, haud incongruum fore arbitror; si statim in limine tractationis declarem, quid per hanc vocem intelligere velim. Vulgo quidem denotat singultus, sonorosam illam expirationem, cum compressione abdominis solito majori stipatam, subsequente deinceps naturali inspiratione; sed revera hic affectus est spasmodico-convulsiva concussio Diaphragmatis & Ventriculi cum Mesenterio & reliquis partibus connexis, sub qua aër cum sonitu per Oesophagum expellitur. Et ita formaliter singultus consistit in motu, generice vero in spasmo, qui est auctior gradus motus constrictorii & relaxatorii i. e. tonici fibrarum.

§. II.

Partes, in quas hic affectus suas truculentias præ reliquis exserit, sunt:

a) DIAPHRAGMA s. septum transversum, quod, ut necessarium respirationis organon, pro unica hujus mali sede agnosco, præeunte *Illustr. HOFFMANNO in Med. Systemat. Tom. IV. Part. III. Sect. II. cap. IV. §. 9. pag. 423.* & *PRÆSIDE in Pathol. sua Sect. VII. cap. IV. §. 4. p. 297.* etsi alias cum veterum Medicorum multi, tum hodiernorum nonnulli, huic sententiæ non subscribant. Ad minimum fieri non potest, cum Diaphragma respirationi in-

serviat, nec singultus unquam, nisi sub respiratio-
ne contingat, quin hic affectus absque hujus mus-
culi ope administrari possit. Sistit hoc Diaphrag-
ma musculus orbicularem amplum, robustum,
abdomen transversim a thorace dividens, cum
centro nervoso, quod Anatomici speculum appel-
larunt, instructum. Connectitur antrosum ster-
no, ad latera costis spuris & musculis intercostali-
bus, retrorsum dorso & vertebis lumborum;
porro cum superficie convexa thoracem versus,
pericardio, mediastino & pleura; denique cum
superficie concava peritonæo, in hypochondrio
dextro Hepati per ligamentum suspensorium la-
tum, & ventriculo in hypochondrio sinistro per
nervos & Oesophagum, qui per musculosam par-
tem hujus septi descendit, & simulac abdomen in-
travit, sinistrum ventriculi orificium, videlicet sto-
machum græcis *καρδιαν*, format. Vasa habet ar-
teriosa ab arteria cœliaca, subclavia & intercostali-
bus provenientia; venosa a vena cava, azygos &
subclavia; nervosa quorum duo a vertebralibus
colli, duo vero a pare vago & intercostali ramo
oriuntur, quæ omnia cum paucis lymphaticis hinc
inde interspersis apud Anatomicos vasa phrenica
audiunt. Situs est obliquus abdomen inter & tho-
racem, sic ut dextra pars elatior, sinistra sit de-
clivior.

§. III.

β) VENTRICULUS, qui est saccus membranace-
us in sinistro hypochondrio, mox sub Diaphrag-
mate

mate inter hepar & lienem oblique situs, gulæ & septo transverso per Oesophagum annexus, ex tribus vel quatuor membranis conflatus. Primam harum membranarum a peritonæo nanciscitur & communis illa est tunica, qua omnia intestina gaudent, ex fibris transversalibus composita; altera est musculosa in qua fibrarum ordo varius observatur; tertia nervosa, vasis sanguiferis & parvis glandulis, quibus liquorem gastricum secerni perhibent, referta; quartam denique addunt alii villosam admodum tenuem; imo alii adstruunt quintam cellulosa dictam, quam intra primam & secundam in ordine collocant: sed hanc litem aliis excutiendam relinquo. Duo habet orificia, sinistrum cardiacum, cui nervi a pari vago descendentes, sese insinuant, & in toto ambitu ventriculi dispergunt: dextrum pylorum. Arterias accipit a cœliaca, intra tendines Diaphragmatis divisa; venas a ramo splenico Venæ Portæ, quas inter, eæ, quæ ad ventriculum & lienem simul decurrunt, figillatim vasa brevia nuncupantur; lymphaticæ pauciores, ut hujus census omnes reliquæ, ad receptaculum chyli abeunt.

§. IV.

γ) PERITONÆUM, quod Diaphragmati & musculis abdominis transversis proxime adhæret, totam hanc cavitatem interius circumcingit. Constat ex duplici membrana tenui, lævi & lubrica, quæ ventriculum, intestina, mesenterium, omentum, hepar, pancreas & lienem quasi in sacco con-

tinet. Processus dimittit varios, in viris præsertim ad scrotum & testiculos, in foeminis ad uterum, cujus ligamenta lata efficit, rotunda vero involvit. Arteriis & venis instruitur ab epigastricis, lumbaribus & diaphragmaticis; nervis a diaphragmaticis, lumbaribus & ossis sacri. Inter ipsam substantiam vasa umbilicalia sita sunt.

§. V.

δ) **MESENTERIUM**, quod est duplicata membrana, quæ multa pinguedine scatet & intestina ipsi adhærentia in situ naturali continet, quibus insuper secundam largitur tunicam cellulosam **RUY-SCHII** dictam, excepto jejunio & ileo, quæ & extimam ab illo suscipiunt. Incipit a tribus superioribus vertebrae lumborum & per totum intestinorum tractum continuat, hoc tamen discrimine, quod, quamdiu circa tenuia versatur, Mesaræum, circa crassa vero Mesocolon nuncupetur. Vasa sanguifera cum intestinis habet communia; nervos accipit a pari vago & intercostali; lacteæ & lymphaticæ venæ, nec minus glandulæ copiosæ, per totam sui substantiam dispersæ reperiuntur, quæ tamen secundum numerum, magnitudinem & situm valde variant.

§. VI.

Sufficiant hæc dixisse de nexu partium, quæ sub singultu commoventur: quamvis enim plures huc referri possent, hæ tamen sunt solenniores, sine quibus mutua conspiratio, qua septi irregularis motus, abdomini communicatur, prorsus intelligi nequit.

Singu-

Singula abdominis contenta speciatim describere non est hujus loci, utut infra pauca adhuc, in quantum instituti ratio id requirit, addenda erunt. Qui interim hunc nexum & egregiam harmoniam partium nostri corporis, ulterius inquirere satagit, ille ad-
eat celeberrimos Anatomicos, BARTHOLINUM, MORGAGNIUM, WINSLOVIUM, HEISTERUM aliosque, imo ipsa cadavera inspiciat. Sane hæc intimior connexio, est fundamentum sensibilitatis naturæ, qua fieri solet, ut si in aliquo viscere stasis sanguinis aut inflammatio, aut actualis læsio adest, tunc reliquæ partes corporis omnes per consensum compatiantur. Quæ res uti per se intellectu jucunda, ita Medico apprime scitu necessaria est.

§. VII.

Sed ad rhombum! Duplicis generis singultus esse solet: alter audit idiopathicus & nullum primarium morbum respicit; alter symptomaticus qui per consensum nervorum in morbis acutis contingit. Priorem, si diutius infistit, chronicum: posteriorem, quia ominosum morborum agit comitem, acutum vocarunt Medici. Utramque hanc speciem antea, paucis pertractabo, quam ad singultum puerperarum seorsim expendendum, me convertam.

§. VIII.

Supra (§. I.) dixi singultum consistere in motu spastico-convulsivo velociter transeunte, quod quidem adfertur per se verum est, teste experientia; interim convenit ut paulo penitius inquiram, qua ratione hi motus contingant, aut quid sibi velint. Ita-

que fieri solet quod, si in ipso Diaphragmate, vel impeditior sanguinis fluxus, vel actualis stasis, vel etiam inflammatio adest, copiosior adfluxus sanguinis vasa illius vehementer distendat; hæc distensio porro efficit ut, dum sub inspiratione septum versus abdomen deprimitur, illico fibræ musculares a centro ad peripheriam usque, valde abbrevientur & nervi comprimantur, sub qua abbreviatione convexa in planiorem magis convertitur figuram & stomachus constringitur: quando demum paulisper remittit hæc tensio & septum sub expiratione in naturalem situm redit, aër in œsophago interceptus & inclusus simul & semel cum nisu exploditur, omnesque partes in abdomine contentæ, ob mutuam, quo connexæ sunt, vinculum, una magna vi sursum & antrosum concutiuntur. Similis ferme ratio est singultus ex ventriculo coorti, quando enim hic multis cibis præsertim flatulentis justo celerius devoratis, oneratur & oppletur, quid mirum, si ob insolitam fibrarum nervearum, (§. 3.) stomachum præprimis ambientium, tensionem & tractionem, septum simul adficiatur & spastica commotio in ambobus proritetur. Et sic etiam serres habet in reliquis visceribus abdominis, stasi aut inflammatione aut alia quavis molestia præsentē, dum enim in ejusmodi pertinaci obstructione, sanguis in copia parti adfectæ instat & urget, fieri aliter non potest, quin exinde major undiquaque extensio & acerbior constrictio resultet, quæ si deinde per nervos Diaphragmati communicatur, talem singultum producere valet. Accedit quod & ipsa textura Diaphrag-

phragmatis ob copiosos nervos & tendines, a natura sub quacunque vel leviori causa ad spasmos & semi-convulsivos motus admodum prona & habilis existat. Insuper haud silentio prætermittenda est illa observatio, qua constat, quod natura non raro ejusmodi concussorios motus, ad aliquid sibi molesti vel discutiendum vel excutiendum suscipiat destinatos, (quem vero finem salutarem non semper ex voto obtinet): quamobrem nunquam plane rejiciendi, aut pro nihilo reputandi sunt.

§. IX.

Postquam igitur modum & processum singultus paucis delineavi, jam ad signa ejusdem explicanda in ordine devenio; ubi statim indico, quod huic affectui sæpenumero profunda & anxiosa inspiratio, cum sensu grauativo & pressorio, circa orificium ventriculi sinistrum, præcedere soleat. Excipit mox hanc exspiratio vehementior, septum transversum cum fortissimo nisu ad thoracem reprimente, & sonitu per os apertum erumpente. Sequitur deinceps naturalis inspiratio, cui etiam interdum, per momentum, exspiratio solita respondet; quæ interval-
la pro diversitate subjectorum & morborum mox breviora mox longiora existunt. Sub ipso hoc motu concussorio, si diutius duravit, exserit sese sensus ulcerosus cum dolore lancinante. Quando demum cessavit, ægri de lassitudine & omnium virium consumptione conqueruntur.

§. X.

Quod subjecta attinet, quibus hic singultus in-
fensus

fensus esse solet, tunc notamus idiopathicum hunc affectum iis ut plurimum evenire, qui vel nimis avide cibos deglutiunt, videlicet bolis grossioribus non debite masticatis, aut carnibus durioribus fumigatis, item fructibus fugacibus austeris vescuntur; vel qui potum frigidum, post prægressam exæstuationem, magnis haustibus ingurgitant, vel etiam dum largius sudant, liberiori aëri ad refrigerandum se exponunt. Qui vero in acutis morbis hanc subitanæ Diaphragmatis concussionem comperiuntur, sunt illi, qui inflammatione quadam interna laborant, sit ea vel in hepate, ventriculo, liene, mesenterio, aut in intestinis. Speciatim vero observatur ille in hystericis fæminis, imo aliquando in puerperis febre acuta correptis, præcipue in primiparis.

§. XI.

Causæ pro diversitate affectus & subjectorum mirum in modum sunt diversæ. Singultus communis vitium ventriculi & primarum viarum nude respicit: quando enim alimenta absque prævia sufficienti masticatione festinanter ingurgitantur, tunc non solum sub ipsa deglutitione singultum provocant, sed etiam cum in ventriculum jam detrusa sunt, multas molestias inducunt. Sic v. g. non raro accidit ut in hominibus voracioribus, portio quædam cibi cujuscunque sub transitu per œsophagum, circa orificium ventriculi restitet, hæc, dum ibidem diutius commoratur, ob gravativam suam pressionem in hoc loco sensibiliore, facile singultum causatur: perinde evenit si cibi ad ventriculum jam delati, ibidem non bene

bene subiguntur & digeruntur, quod ex hinc indu-
ctis cruditatibus ac flatulentis ejusmodi irritatio pro-
cedat. Ita saburra biliosa in infantibus singultus cau-
sa est. Potus frigidus non bene defæcatus, nec non
aëris subitanea mutatio, ex calore in frigus ac vicif-
sim, & quidquid præterea alterationem quandam, si-
ve illa consistat in nimia fibrarum expansione, si-
ve in constrictione, si-ve denique stimulatione, ad ejus-
modi motum producendum sufficiens est. Sic alle-
gat casum, ubi frustulum quoddam panis incaute
deglutitum, singultum excitavit FERDINAN-
DUS *Hist. Med. Conf. 43.* Præterea & subinde medi-
camenta refrigerantia, emetica, drastica, stomachica
calidiora, aliaque quæ generatim stimulant, rodunt,
urunt, vellicant ad nostrum affectum ansam dede-
runt. Huc pertinent etiam omnia venena corrosiva,
imo omnia peregrina in ventriculum delapsa e. g. ver-
mes; serpentes, ossicula piscium & aciculæ ex im-
proviso assumptæ.

§. XII.

Singultus symptomaticus morbum quemcunque
primarium pro causa agnoscit. Ita accedit febribus
acutis & malignis, in paraphrenitide, in inflammatio-
ne infimæ partis in hepate, pylori, mesenterii, uteri,
intestinorum, in dysenteria, in cholera & causo, in
colica. Observatur deinde in inflammationibus ex-
ternis, in diarrhœa, in suppressione hæmorrhoi-
dum nephriticorum, in retropulsione affectuum po-
dagricorum. Porro post retrocessionem exanthe-
matum in variolis, in morbillis, in febre purpurea.

C

Tan-

Tandem comitari solet excessivas sanguinis profusiones, vulnerationes graviores, distorsiones, luxationes & fracturas costarum, nec non pectoris malam conformationem. Rationem hujus phænomeni, cur nempe singultus tam multis morbis sese associet, varii variam tradiderunt. Alii per acrimoniam nervos stimulantem & vellicantem illud explicare contendunt, alii vero a spastica constrictione fibrarum & motu tonico auctiore id ipsum derivant. Priorres quod attinet, nescio qualem sibi fingant acrimoniam in inflammatione partium internarum & externarum, in hæmorrhoidum & mensium suppressione, ut & in exanthematum aut sudoris critici retropulsione: & posito sed non concessio quod etiam sub hac repentina alteratione, acrimonia quædam generaretur, ea sane non tanti est, ut talem motum spasmodico-convulsivum producere possit. Quamvis enim non omnem absolute negem acrimoniam in corpore nostro obviam, ei tamen ne minimam nervos vellicandi vim tribuo, exceptis solummodo emeticis drasticis, purgantibus fortioribus & venenis corrosivis, quippe quæ omnino stimulando & irritando vim suam exferunt. Quod vero ad alteram spectat speciem, qui singultum augmento motus tonici adscribunt, eorum sane sententia mihi cum ratione maxime consentanea videtur. Constrictione enim peripherica facta, sanguis per leges motus ad interiora repellitur, vasa sanguifera inflantur, distenduntur, nervi comprimuntur, fibrarum muscularium rigor introduci-
& Diaphragma cum toto abdomine spastice contrahitur.

§. XIII.

Expositis indole, signis, subjectis & causis singultus, ordo tractationis ad prognosin me deducit, ubi generatim annotamus, singultum vulgarem chronicetoccurrentem, non multum quidem periculi, verum tamen multum molestiæ involvere: quam enim exempla dentur, in quibus singultus sine morbo acuto lethalis fuit, ea tamen sunt rarissima. Quod si autem hic affectus sæpius recurrit, majorem considerationem meretur, quippe læsionem quamcunque visceris vitalis indicare videtur, præsertim si a labore & sub motu quovis externo mox exacerbetur, id quod etiam vel ex gradu & vehementia, quo hic ab illo, qui per vices tantum homines corripit, differt, colligere licet. Non magni momenti est singultus ex ventriculi cruditatibus enatus. Qui vero morbis acutis supervenit, præsertim versus dies criticos, haud caret periculo; facile enim hi motus spastico-convulsivi in veras convulsiones, per universum corporis habitum transeunt, quibus ægri brevi tempore exspirant: ad minimum anceps & valde dubium est signum. Sic singultus in inflammationibus internis, lethalem & funestum præagit eventum. In febre ardente grave ostendit periculum, imprimis accedentibus deliriis. In morbis chronicis, scirrhis, periculosis infarctibus, præsentibus aut imminentibus corruptionibus omnis spes vitæ concidit. Quem post se trahunt exanthematum retrocessiones, hæmorrhoidum nephriticorum, podagræ & sudoris critici retropulsiones, periculo certissimo non vacat.

Post largam cruoris vitalis jacturam & capitis vulnera inflicta, mortis imminens tristissimus est nuntius. Post vomitum largum & alvi fluxum, in diarrhœa mucida, biliosa & cruenta, mali ominis est. In colica dirum & pessimum symptoma. Qui denique costis fractis, distortis luxatisque accedit, imminentem inflammationem prædicit.

§. XIV.

Ad Therapiam nunc adesset transitus, sed quia singultus communis, per vices irruens, nullam requirit; quippe qui vel sola compressione abdominis facta cessat; vel seria meditatione abigitur; vel denique grato aut ingrato objecto cedit: alterum mihi reservabo, donec de curatione singultus puerperarum, qui ad seriem symptomatici & acuti haud inique refertur, sermo instituendus erit. Mitto itaque generatorem hanc considerationem & ad specialem illius singultus, qui puerperas aliquando corripit, explanationem progredior. Tria heic momenta maxime notatu digna se offerunt, quibus neglectis res manet obscura & intellectu difficilis. Primum comprehendit nexum uteri cum reliquis partibus & visceribus abdominis; alterum ostendit ejusdem consensum cum Diaphragmate per nervos; ultimum indicat communicationem vasorum sanguiferorum, in specie Venæ Portæ cum utero. Singula in sequentibus accurate & ad amissim consuectabimur.

§. XV.

Uterus est pars sexus sequioris musculosa cava, piri compressi figuram referens, in pelvi, quæ ab offi-
bus

bus ilei & sacro constituitur, sub regione hypogastrica, medium inter vesicam urinariam & intestinum rectum sita, generationi inserviens. Constat ex tribus membranis vario fibrarum plexu compositis, intertextis simul vasis copiosissimis. Externa, quam communem dicunt, a peritonæo prognata, duplicem habet lamellam, hinc robusta valida admodum & crassa est. Media musculosa, in non gravidis compacta dura & firma, in gravidis spongiosa & mirifice dilatabilis existit: quam ob causam sub partu foetus exclusionem maxime promovet. Interna cavum uterici cingens, nervea, sensibilis & porosa est, in qua oscula vasorum terminantur. Posterius intestino recto innititur & coalescit per pinguedinem, anterius cum vagina cohæret, vesicæ proxima. Ad latera quatuor suspenditur ligamentis, e quibus duo lata, alæ vespertilionum vocantur, & duplici constant lamella membranacea cum peritonæo continua, utrinque uterum pelvis parietibus jungentia; duo rotunda a parte superiori uteri oriuntur, & postquam per annulos musculorum abdominis transierunt, in pinguedine circa inguina desinunt. Substantia horum ligamentorum est itidem membrana duplex vasculis & fibris lacertosius instructa, quæ vero non nisi in prægnantibus & gravidis in conspectum veniunt. Magnitudo in virginibus minor, in gravidis diversaprehenditur. Dividitur in partem superiorem & inferiorem: superiorem, quæ latior est, fundum, inferiorem quæ angustior, cervicem nuncupant.

§. XVI.

Patet ex hac descriptione uteri, secundum ejus substantiam, formam, situm & nexum, quod omnis communio, quam cum reliquis contentis abdominis possidet, fiat vel per continuum, mediante peritonæo ope ligamentorum quibus ipsi adhæret, vel per contiguum, quatenus in confinio aliarum positus est, & cum illis commercium habet. Vi præcedentium (§. 2. & 4.) notum est, peritonæum junctum esse Diaphragmati & totum abdomen interius investire, imo pleraque viscera quasi in sacco excipere; quippe incipit a septo & per totum cavum ventris secundum longitudinem & latitudinem usque ad os pubis excurrit, ubi postquam margini s. cristæ ossium ilei accreverit & ad ischia se demiserit, circa os sacrum reflectitur & iterum adscendit, quo ipso fit ut postea sacculum formet & intestina cum aliis sæpe nominatis partibus inter duplicaturam suam comprehendat: hinc luculenter apparet, quod commoto Diaphragmate, cunctæ connexæ & vicinæ etiam moveantur, necesse fit, unius enim partis in loco mutationem, sequitur reliquarum adhærentium motus.

§. XVII.

Jam consensum qui utero intercedit cum Diaphragmate per nervos illustrabo. Cardio hujus rei præcipue versatur circa ramificationes paris vagi, intercostalis & ossis sacri. Par vagum, quod a vagari, quia per totum corpus fere undique divagatur, nomen retulit, aliis etiam sextum vel octavum audit juxta BARTHOLINUM *in Anatomia reformata Libr. III. cap.*

cap. II. pag. 460. infra nervum auditorium f. par septimum e lateribus medullæ oblongatæ oritur variis fibris statim unitis. Mox juxta sinus laterales duræ matris egrediens, supra jugulum utrinque dividitur in duos truncos, quorum alter exterior, alter interior vocatur. Exterior in duos iterum dispescitur, quorum dexter statim in principio furculos emittit ad musculos claviculæ & sterno adfixos, deinde constituit NERVOS ita dictos RECURRENTES five vocales, & postquam sub jugulo oblique descenderrat, pulmonibus, pleuræ, pericardio & cordi propagines suas impertitur, inde per septum ad Oesophagum transiens, stomachico dextro formato cum sinistro jungitur. Exterior sinister eodem modo ut prior partibus prospiciens, facto nervulo stomachico sinistro, ad orificium ventriculi sinistrum, perforato septo pergit, & illo cum compare amplexo, porro ad janitorem & hepatis cavum accedit. Interior ramus paris vagi duobus furculis gaudet, quorum dexter primo ad radices costarum, quolibet nervo intercostali ramulum largitur, deinde cum arteria magna per Diaphragma descendit, & per totum infimum ventrem mirifice discurrens, ad os usque sacrum abit. In hac via iterum triplici modo distribuitur, mox enim furculo ad omentum contendit, mox ad renem dextrum alio, maximo denique ad mesenterium, intestina & vesicæ dextrum latus. Interior sinister in suo latere perinde propagatur, nisi quod loco hepatis ad lienem pars abeat; ab utroque tandem interiore ramo in fœminis propagines ad uterum mittuntur.

§. XVIII.

Ad par intercostale provolvor, cujus principium & originem accurate detegere, tanto est difficilior, quo major in eo præstantissimorum Anatomicorum est dissensus. Quia juxta radices costarum incedit & multis ramulis e spinali medulla dimissis, coalescit, inde nomen reportasse videtur. Nonnulli ramum paris vagi: alii contrarium statuentes, utriusque nervorum paris, vaginempe & intercostalis, ortum, truncum & divaricationes maxime distinctas esse volunt, non obstantibus furculis, quibus identidem concrecant: alii ramulo paris quinti & sexti originem adscribunt: alii demum his iterum contradicentes, hunc peculiarem esse nervum, furculos tantum quosdam a pare quinto & sexto recipientem, omnimode defendunt. Quæ ex hisce variis opinionibus veritati quam proxime respondeat, ego dijudicare nolo, mihi sufficiet hujus paris cursum, quantus ad meum scopum conducit, qua fieri brevitate potest, monstravisse. Nervi, par intercostale constituentes, cum per totum decursus tractum, innumera fere ganglia efforment: ab Anatomicis pro loci & situs ratione in certas classes dividuntur, quarum alii cervicales, alii thoracicos, alii imi ventris plexus designant. Ganglion primum cervicale, magnitudine maximum, superius ramulum dimittit ad os temporale & ipsius petrosam partem, deinde multos furculos dispergit, qui secundum WINSLOVIUM paris sexti & quinti ramificationibus junguntur, & tantum consensum præstant, non vero principium & originem,

nem, juxta præclaros Anatomicos WILLISIUM, VIEUSSENIUM & HEISTERUM, constituunt. Inferius, multis furculis iterum pari vago annexis, per canalem carotidis internæ cranio exiens, multos ramulos laryngi, faucibus & musculis harum partium largitur. Exceptis deinde ramulis ubicunque e medulla spinali exortis & multis gangliis minoribus cervicalibus productis, juxta par octavum per collum descendit. Thoracem intrans truncus hujus nervi denuo intumescit, & in radice costæ primæ, primum dorsale ganglion format. Progredienti porro inter singulas dorso vertebrae ex medulla spinali alii sese adjungunt nervuli, qui quoties coalescunt, toties fiunt ganglia nova. Ubi ad medium fere thoracis pervenerit insignes quinque rami ex hoc pari gignuntur, qui multis gangliis formatis iterum uniuntur & Diaphragma, missis simul ad hoc aliquot furculis, perforant. Hinc denuo divaricatus, efformatis utrinque plexibus semilunaribus, ad dextrum & sinistrum decurrit. Dexter ramus deinde tam hepaticum quam renalem plexum dextrum constituit: postea cum circa internodia vertebrarum lumborum & ossis sacri, tumorem exiguum nactus est, in duos ramos exteriorem & interiorem dividitur; quorum exterior nervo dextro primi paris in osse sacro accrescit & cum illo in dextrum cruralem definit; interior vero in plures fibras abit, ano & partibus adjacentibus prospicientes. Sinister paris intercostalis ramus, eadem ratione ac dexter, duos furculos progignit, exteriorem alium, alium interiorem: exterior fini-

D

stro

stro nervo primi paris ossis sacri coalescit, & cum illo in finistrum nervum cruralem terminat; interior vero innumeras ablegat propagines ad ureteres, vesicam, intestinum rectum & in sexu sequiori ad uterum, quæ cunctæ deinceps in his locis evanescent.

§. XIX.

Pergo ad nervos ossis sacri, quorum cum quinque ut plurimum paria, aliis sex numerentur, primum illud est, quod ob vicinitatem in mulieribus cum utero habet commercium. Superius ex hoc pari progerminant ramusculi pari quarto & quinto nervorum lumbarium (quorum par primum utrinque furculum Diaphragmati largitur) se insinuantes, cum quibus concurrente secundo, tertio & quarto pari ossis sacri nervum ischiaticum sive cruralem posteriorem, totius corporis maximum, componunt: inferius excurrentes omnes, partibus in pelvi sitis, intestino recto, vesicæ, utero, & musculis circumjacentibus impenduntur, ubi etiam disparent. Hac nervorum eximia connexione, mutua eorum in osculatione, imo tot ramificationum, vario modo invicem contextarum, distributione rite perspecta, nemo sane mirabitur, qui fiat, ut, si in inferioribus partibus status morbosus obvius est, ille statim aliis nobilioribus v. g. capiti, pulmonibus, septo transverso, communicetur. Quemadmodum enim fieri solet, ut ii qui cruditates in ventriculo foveant, capitis doloribus persæpe vexentur insignibus, id quod consensui paris octavi & quinti nervorum potissimum debetur; ita etiam in aliis partibus contingere haud immeri-

merito concludimus: exemplo sit singultus, qui puer-
peris aut hysteriis familiaris est, ubi læsio quæcun-
que uteri suspicatur, aut eandem actu præsto esse
certis signis edocemur. Equidem mens mea non
est, omnem consensum ex nervorum extremitati-
bus, & ab his contextis membranis deducere; nihil-
ominus verisimillimum mihi videtur & rationi con-
sentaneum, consensum qui est inter partes longe re-
motas & diffitas, a motu fibrarum nervearum prima-
rio dependere. Dum enim una movetur fibra ner-
vea, altera huic annexa in similem motum concita-
tur. Quum præterea Anatomia doceat, quod di-
versi nervi crebro plexus quosdam producant, aut
modis quibusdam jungantur: intelligitur quo pa-
cto passio unius nervi cum altero, quocum coaluit,
communicetur, sicque tam longe lateque diffunda-
tur, ut ne quidem satis excogitari possit. Inde com-
motus B. E T T M Ü L L E R U S in suis Operib. Tom. II.
p. 36. egregie ponit: *Consistit ergo consensus partium in
connexione unius cum altera, quæ triplici imprimis solet fie-
ri ratione, ita quidem omnis proprie dictus consensus fit ra-
tione saltim nervorum. Consentunt nempe partes nerveæ
triplicimodo; primo quatenus fibræ nerveæ sunt continuæ,
qua ratione imminente vomitu tremit labium inferius; vel
secundo quatenus sunt contiguæ, quarum ratione calculus
vesicæ subinde stimulum infert alvi & tenesmum excitat,
quia collum vesicæ & intestinum rectum invicem incumbunt;
sic adfecto orificio stomachi sequitur singultus. Tertio con-
sensus partium fit ratione connexionis mediantibus funiculis
nervis, qua ratione consentiunt renes, ureteres & intesti-*

na, stomachus & caput. Qui ceterum nervorum subtiliorem disseminationem & mirificam concatenationem, accuratius perspicere cupit, evolvat *WILLISIIUM de cerebro & nervis*, *VIEÜSSENIUM in Neurographia figuris maximis & splendidis* illustrata, nec non *BAGLIVIIUM in Specimine suo de fibra motrice*, qui per varia experimenta, in animalibus & brutis instituta, quanti sit vis consensus per nervos, explorare annisus est.

§. XX.

Restat ut demonstrem communicationem uteri, cum aliis partibus in imo ventre sitis, per vasa sanguifera, arteriosa æque ac venosa. Accipit vero uterus suas arterias partim a spermaticis, in viris ad testiculos, in foeminis recta ad ovaria, uterum, tubas Fallopianas & ligamenta lata descendentibus; partim ab hypogastricis ad latera & vaginam tendentibus ac per cavum ossium ilei dispersis; partim ab hæmorrhoidalibus externis, cunctis ab Aorta dimissis. Venæ triplicis generis ejusdem nominis, valvulis destitutæ, a vena cava prognatæ, fundum & collum uteri ubique perreptant, quæ etsi alias exiles, tempore tamen gestationis adeo turgent, ut emulgentium fere amplitudinem induant. Cum itaque Aorta est, communis ille canalis magnus pulsu præditus, per quem sanguis e corde ad omnes, imo extremas corporis nostri partes devehitur, inque illis ubivis diffunditur; per Venam Cavam vero tanquam vas magnum, pulsu destitutum hic sanguis quaquaversum e partibus resorbetur, & postquam in amplissimum suum
cana-

canalem collectum fuerat, ad cor revehitur: ita quoque colligimus utrum aliis partibus per vasa sanguifera correspondere & læsa una vel altera, reliquas adfici.

§. X X I.

Vena Portæ eandem habet cum utero correlationem, qua de causa non abs re erit, & eam heic describere. De nomine undenam nacta fuerit, nondum conveniunt autores, sed undecunque demum venerit, utique hæc denominatio hodie usu recepta est. Sita est in abdomine arboris inversæ faciem præsentans, post venam cavam maxima, attamen quoad texturam non ita densa, sed laxior & mollior. Alii originem venæ umbilicali; alii innumeris furculis venarum ex intestinis exortis, & in unum truncum coëuntibus adscribunt; alii ex cava hepatis parte, Portam nempe illam derivant. Dividitur in truncum & divaricationes seu ramificationes diversas, quarum aliæ superiores alii inferiores sunt: illas vocant radices, qui ex hepate hanc venam oriri volunt, has vero, qui a venis mesaraicis eam produci putant. Superiores rami non solum per hepatis cavam partem sive finem disperguntur, sed etiam innumeri furculi universum ejus latifundium subeunt. Truncus antequam dividitur, mittit duas venulas ad vesicam felleam, cysticæ gemellæ dictæ, unam ad ventriculi latus dextrum, gastrica dextra nuncupata, aliamque ad intestinum duodenum, inde duodena nominata. Postea inferius in duos ramos insignes dilatatur, quorum alter sinistrorsum ad lienem extensus, ramus spleni-

cus; alter dextrorsum ad mesenterium abiens, Mesaraicus appellatur. Ramus dexter, antequam ad mesenterium deferatur, producit duas venas, epiploicam dextram & gastro-epiploicam dextram; deinde totus mesenterium ingreditur, ibique in tres ramos insignes, quos mesentericos vocant, distinctus, in innumeras venarum propagines anonymus diffunditur, quæ in intestinorum tunicis evanescunt. Ramus sinister splenicus antequam ipsum splenem attingit, sursum venam gastricam minorem efficit, & majorem, amplissimam omnium ventriculi venarum, quæ ultima postea coronaria illius vasa constituit; deorsum gignit tres furculos pro omento, ventriculo & pancreate, qui dicuntur Epiplois sinistra, Gastro-epiplois sinistra & Pancreatica; ubi proxime ad lienem accessit, format vasa brevia & deinceps in splene totus absorbitur. Splenicus hic ramus, mox ubi a trunco secessit, itidem insignem & capacem propaginem generat, videlicet venam hæmorrhoidalem internam, quæ mox deorsum ad intestini recti inferiorem portionem, spithamæ circiter longitudine illud ambiens, imo aliquot furculis ad uterum distribuitur, affirmante B. STAHLIO in *Dissert. Vena Portæ porta malorum*, quæ curante PRÆSIDE de novo typis exscripta, in *Tractatu de Hæmorrhoidibus* legitur, ubi *Sect. I. p. m. 31.* Vena Portæ inquit: *sita est in abdomine & quidem specialiter disseminata, tum in partem sinistram hepatis, tum ad ventriculum, splenem, omentum, mesenterium, intestina, imo in fœminis aliquot ramulis ad cervicem uteri quoque distributa; & Sect. II. p. m.*

42. *Antequam sectionem hanc finiamus, lubet adicere communionem venæ portæ per ramos aliquot, præcipue de hæmorrhoidalibus cum cervice & vagina uteri. A quibus non injuria suspicio est, proficisci notabiles illos consensus, qui inter mensum & primarum viarum turbas, quasi reciproce fieri observantur. Huic adstipulatur BARTHOLINUS in Anatom. Reform. lib. I. cap. XXIII. p. 165. hinc utero & lieni magnum consensum tribuens, & VERHEYEN in Anatomia sua.*

§. XII.

Triplici hoc nexu uteri cum aliis in abdomine contentis per ligamenta; cum Diaphragmate & Ventriculo per nervos; communicatione cum vasis sanguiferis, in specie cum Vena Portæ commonstrato, jam in ordine indagandum erit, quomodo hæc mira conspiratio invicem succedat. A priori autumo quod si in puerperis lochia sufflaminantur, aut in fœminis hystericis sanguis, quod per venulas uteri menstruatim funditur, retinetur, ex hac obstructione illico major fiat oppletio, distensio & infarctus illarum, quæ deinde vel redundantiam versus superiora, præsertim lieni aut hepatis molestant, creat; vel dum diutius circa uterum subsistit, nec per commoda remedia, paucis diebus post, promovetur, in corruptionem abit, ad quam præcavendam inflammatio præcedere solet. In priori casu hæc redundantia sanguinis præcipue per venam hæmorrhoidalem internam ad hepar & lienem, etiam Diaphragmati & ventriculo infensam esse, magnamque in illius motum alterationem introducere potest, observante
ite-

iterum B. STAHLIO in *Diss.* supra allegata *Sect. I. p. m. 34.* dicens: *Simul præterire non decet, quod locus ille, quasi centrum Mesenterii, ubi ramorum horum ex ipsa Vena Portæ divaricationes quasi primo prognascuntur, quod inquam portio illa mesenterii, ipsis processibus Diaphragmatis, ubi in tendines abeunt, circa infimas vertebrae Thoracis, sic satis tenaciter, per fibras cobæreat: unde quidem pathemata illa consensualia Diaphragmatis suffocativa, suspiriosa, anhelata, turbis circa venam Portæ accedere solita, mechanicam suam oriendi rationem habere videntur.* Cum autem huic infarctui distensorio, redundantiam causanti, spasmodica symptomata maxime consequantur, annotante jam pridem WILLISIO, dehinc etiam, si paululum ultra modum augmentur, singultum produci posse judico, vide sæpius nominatam *Dissert. pag. 46.* Quod si vero posterius eveniat & vel inflammatio oriatur, aut sanguis in actuale corruptionem ruat, tunc hæc adversa sensatio, per nervos, mox partibus superioribus, in specie Diaphragmati communicatur & motus singultuoso-concussorius semi-convulsivus excitatur, tanquam ultimum molimen, quo motus grave periculum imminens, avertere conantur. A posteriori quotidiana docet experientia, quod ira, terror, leve quoddam diætæ vitium, refrigeratio subitanea, menstruum in hystericeis, aut lochiorum fluxum in puerperis sæpe fistant. Hoc facto non ita multo post sentiunt angustationes, pressiones, tensiones, stricture, spasmos in imo ventre, difficultatem respirandi, cardialgiam, vomitum, suffocationes, quæ
omnia

omnia uti de spastica strictura abunde satis testantur, ita etiam sæpenumero singultum in consortio secum trahunt. Quæ pathemata prorsus cessare observantur, mensibus aut lochiis in pristinum ordinem reductis, luculento & evidenti signo, quod sanguinis incarcerationio, tam varia motuum spastico-convulsivorum schemata concitare possit. Confer de hac re PRÆSIDIS *Pathol. Sect. II. cap. VI. p. 156. seqq. & cap. XVIII.* sic etiam ejus *Dissert. de Hæmorrhoidibus medicina Hypochondriacorum Ao. 1716.* habitam, nec minus WILLISII tractat. tit. *Pathologiæ Cerebri Specimen.*

§. XXIII.

Sanguinem in Vena Portæ, vi mechanismi & structuræ §. 21. exhibitæ, ob innumeras incurvationes impeditius circulare, facilius coacervari & spissescere posse novimus. Inspissatus itaque opus habet propensione vegetiori, quæ peragitur modo intestinorum, modo mesenterii, modo splenis, imo stomachi, septi & præcordiorum variis pressioni- bus, torsionibus, laxationibus & constrictionibus spasmodicis, ex quibus nascuntur variæ partium harum motitationes & sanguinis ab una ad alteram ipsarum transpulsiones. Hi motus uti Hypochondriacis familiares esse, eosque valde exercere & excretionem hæmorrhoidalem in viris respicere, præclari Medici uno ore profitentur: ita multo magis, imo frequentius & contumacius iidem scæminis obtin- gunt, tum directe ob aliquam uteri cum ramis hæ- morrhoidalibus conspirationem, tum indirecte & mediate, quia generalis ad minimum consuetudo

E

excre-

excretionis sanguinis, stato tempore tam in puerperio, quam extra illud apud illas solennis est, bene monente B. STAHLIO in *Diff. citata Sect. III. p. m. 57.* & PRÆSIDE in *Patbol. Sect. II. cap. X. §. 10. p. 166.* his verbis: paulo proximius cum motu mensium conveniunt, restrictiones sanguinis ad loca hæmorrhoidalia, ad ventriculum & vesicam, ob harmoniam motus progressivi sanguinis per vasa uterina, Venam Portæ, hæmorrhoidalia & hypogastrica vasa: si itaque contingit ut ex uterinis locis sanguis non exprimatur, tunc motus hic congestorius mox in has partes applicatur, inde evenit ut si actualis eruptio supervenit, æque Vena Portæ, vasa hæmorrhoidalia & hypogastrica leventur & ventilentur, ac si sanguis ex locis uterinis effluxisset. Quæ omnia collatione rite instituta & bene pensitata, adsertum meum, quo singultum puerperarum a consensu partium, in specie septi transversum cum utero, demonstrare conatus sum, satis evincunt, ejusque veritatem abunde testantur.

§. XXIV.

Puerperæ, quæ hunc singultum experiuntur, ut plurimum sunt foeminæ naturæ sensibilibioris atamen vegetioris, temperamento sanguineo-cholerico vel cholerico-sanguineo præditæ, in vita sedentaria cum lautiori diætâ constitutæ, animi pathematibus valde obnoxia, quæ postquam ante matrimonium variis mensium turbis laboraverant, primum foetum admodum difficile excluderunt: qualem casum Excellent. JUNCCKERUS mihi communicavit, de primipara ætatis junioris, quæ aliquot momenta post partum, angustiam quandam præcordiorum exper-



experta erat, cum anhela valde inspiratione, quam extemplo singultus sequebatur, cum ardore circa orificium ventriculi sinistrum molesto. Specialius vero omnes quæ violentum partum perpeſſæ ſunt, infante non naturali, ſed inverſo ſitu nato; item quæ gemellos pepererunt: qualis caſus mihi ipſi conſtat in puerpera, honeſtioris conditionis quadraginta annorum, quæ poſtquam geminos enixa erat, duobus circiter poſt partum horis inſigni & notabili ſingultu, per integram horam corripiebatur. Sic etiam in aliis nonnunquam puerperis, multa prole in lucem edita, pariendo quaſi adſuetis, ſingultus obſervatur, ita ut in quibusdam naturalem ferme propenſionem ad ſingultum adeſſe, propemodum liceat ſuſpicari.

§. XXV.

Cauſæ huius ſingultus puerperarum ſunt, vel ipſe partus laborioſus & difficilis, vel lochiorum nimius fluxus, vel eorum imminutio, aut plenaria ſuppreſſio. Prioris ratio in ipſo partus proceſſu quaerenda eſt; quando enim fœtus juſto tempore ad partum idoneo ſitu ſe accinxit, membranas & involucra ſua diſrupit, ut aquæ extra uterum profluant, tunc ſequuntur motus ad partum ſpaſtici, a lumbis ad inguinalem regionem tranſeuntes, ſub quibus ſuccedit vehemens dilatatio & extenſio orificii uteri interni cum vagina & partibus genitalibus externis, adeo ut infans penetrare poſſit, quo factò parturiens ſpiraculum tantisper comprimere debet, donec infans totus, adjuvantibus obſetricis manibus, matris corpus egrediatur; ſi itaque valida hac de preſſione toti-

us abdominis & renibuſus inferiora, peritonæum cum ſepto cui adnatum (§. 2. 4. & 16.) fortiffime deorſum trahitur, emiſſo poſt partum ſpiraculo, vi motus tonici neceſſario ejusmodi ſpaſmus reagens verſus ſuperiora contingit: (ut taceam quod ſub hac temporaria reſpirationis intermiſſione, & in ipſo Diaphragmate, ob circulum ſanguinis retardatum, oriri poſſit aliqualis infarctus aut ſtaſis, quæ illico eſt diſcutienda:) quo major enim eſt fibrarum dilatatio, extenſio relaxatio, eo major vi ſtructuræ ſequitur earum conſtrictio. Præterea ſenſibilitas primipararum hocce motus multo fert ægrius, quam ſi multo partu indurata, illis in conſuetudinem venerunt: inſuper etiam improvida & violenta, obſetricum quarundam placenta uterina, niſi ſponte ſequitur, ab ejus ſubſtantia avulſio, multoties efficit ut motus hi ſpaſtici diutius quam par eſt inſiſtant, qui dolores poſt partum continuantes, in convulſiones, niſi mitigentur, tandem degenerant, quarum fere ſemper prodromus eſt ſingultus. Altera cauſarum erat nimius lochiorum fluxus, qui inſignem plethoram utique pro fundamento habet. Quemadmodum autem ejusmodi largior fluxus in puerperis ſanguinolentis, ſi juſto tempore ſponte imminuitur cæteroquin ſalutaris eſt, tamen ſi contumacius inſiſtit, ut exhauriri videantur ægræ, idem illud evenit, quod in aliis enormibus ſanguinis profuſionibus per vulnera graviora fieri ſolet, nempe ut ſingultus convulſivis agitationibus, ceu ultimis naturæ eluctatoriis conatibus ad vitam conſervandam, antecedit. Hunc fin-

singultum veteres ex inanitione denominarunt, in-
 ente Illustr. & Excellent. HOFFMANNO in *Med.*
Rat. Systemat. Tom. IV. Part. II. Sect. II. cap. IV. §. 17. pag.
427. ubi ait: *Ad acutos & ancipites eventus, singultus re-*
ferendi quoque sunt, qui secundum veteres inanitionem seu
nimias humorum excretiones sequuntur; & paulo post:
eundem affectum post se trahunt cruoris vitalis nimiae ac in-
coercibiles effusiones, vel naturales per uterum, nares, hæ-
moptysin, vel per vulnera graviora concitatae, sicuti idem
Hippocrates Sect. V. Aphor. 3 significat. Tertia est lochi-
 orum imminutio vel suppressio, quæ aut ab abundan-
 tia sanguinis cum spissitudine qualicunque juncta, aut
 ab orgasmica sive turgida ejus commotione dependet.
 Si sanguis est spissiusculus ægerrime per venas uteri
 exprimitur, hinc infarctus, stasis, corruptio, spha-
 celatio; si vero orgasmus adest febris inflammatoria
 cooritur, in qua, cum directio & restrictio copiosioris
 sanguinis bene adhuc fluidi, ad portionem illam mo-
 tu privatam, obvia sit, per consequens vasorum san-
 guiferorum insignis tumefactio, singultus per con-
 sensum nervorum prolicitur, quem veteres ex reple-
 tione derivarunt. Vide FOREST. *lib. XVIII. cas. 12.*
p. 289. Ad singultum puerperarum porro contribu-
 unt omnia animi pathemata, præsertim iracundia &
 terror, quibus peripherica constrictio causatur &
 sanguinis restagnatio ad interiora invitatur, deinde
 secundinarum, aut portionis saltem illius retentio,
 quæ si non quantocyus expelluntur, facile in putre-
 dinem, utero posthac læsionem minitantem, dila-
 buntur.



§. XXVI.

Ominosum esse singultum, qui inflammationibus internis supervenit (§. 13.) jam indicavi. Hinc non sine ratione suspicor, eum in febre inflammatoria puerperarum multo majorem periculum contestari; siquidem natura, quando per varios labores aut molimina, sanguinis lochialis vel retentionem (si nimis fluit), vel excretionem, (si imminutus vel suppressus est) aut staseos inde enatae resolutionem diutentavit, & sentit, quod voti compos fieri non possit, ipsa omnes motus prorsus omittit & imminente corruptione, totalem machinae humanae destructionem & mortem inferente, succumbit. Ipse HIPPOCRATES *Aphor. VII. 10.* edixit: *Singultum, convulsionem aut delirium, ilei inflammationi supervenientem, mortem praedicere:* id quod si verum est, uti nullus dubitabit, eodem jure de singultu, uteri inflammationi accedente, idem illud vaticinari possumus; quemadmodum Celeb. JUNKERUS in *Conspect. Semiolog. Tab. VI. no. 31. p. 370.* ex Hippocrate id inculcare videtur: *Singultus in febris semper suspecti habentur, quia vel hepatis, vel ventriculi, vel uteri inflammationes arguunt.* Interim haec non ita intelligi volo, ac si in singultu puerperarum, Medicus semper absolutam lethalityatem pronunciare debeat, sed tantum ut vigilet, causas diligenter scrutetur, successum & vigorem sedulo observet, & nisi post tres, vel quatuor, aut ultra, horas, in tantum remittat, aut medicamentis ad eundem sopiendum propinatis auscultet in totum, periculum metuendum adstantibus conditionate, & cum restrictione qua-

quadam adhibita, indicet. Nam crebra observatio Medicos practicos docuit, quod in acutis non raro pessima quæque signa occurrant, & æger tamen restituitur: contra in aliis omnia placide & tranquille administrantur, æger bene se habeat, & tamen mors scenam claudat, non sine omnium consternatione. Hinc clandestina malignitas semper bene attendenda & respicienda est, ac prognosis provide instituenda.

§. XXVII.

Recensitis origine, causis & prognosi singultus puerperarum, jam ad ejus curam investigandam me convertere deberem, quum autem supra (§.14.) nullam de Therapia singultus feci mentionem, sed eandem usque eo prætermisi, placet pauca, quæ ad curationem singultus generatim spectant, prælibare, antequam in specie de profligando puerperarum singultu agam. Quando igitur singultus communis, si semel incepit, diu durat, & quod subinde contingit, ad unam vel alteram septimanam se extendit, consequenter chronicus evadere videtur, simulque cruditates & sordes primarum viarum suspectas reddit, tunc triplex indicatio formanda est. Alia materiam perniciosam præparat, alia præparatam evacuat, alia roborat. Materiam præparantia sunt salia media amarulenta e. g. tartarus vitriolatus, sal mirabile Glauberi, Arcanum duplic. &c. quo etiam referri meretur Liqueor terræ foliatæ tartari, nec non alcalina sal Card. bened. Absinth. Cent. min. Liqueor nitri fixi s. Alkahest Glauberi; porro Elixiria ex radicibus & herbis resolventibus incidentibus & balsamicis confecta, quæ
lia

lia sunt: Radix Pimp. alb. Ari, Angelicæ, Caryophyl-
lor. Calam. aromat. Vincetoxici, Hba Cent. min.
Card. Ben. Meliss. Hyssopi, Scordii, quæ omnia egre-
gii sunt usus. Si aliquid biliosi aut acris adest his in-
terponantur absorbentia, cum antimoniato fixo & ni-
tro maritata, quo nomine veniunt Conch. præp. vel
citrat. Ocul. cancror. præp. Corall. rubr. & alb. præp.
Matr. Perlar. Chrystallus montana, C. C. ustum, ubi
quidem pulvis absorbens Fr. Hoffmanni & B. Wede-
lii facile sunt instar omnium. Huc etiam pertinent
diluventia & potus quicunque calidi Théë, Coffée, de-
cocta avenacea, hordeacea, omniaque mucilaginosæ,
quæ visciditates extenuant, abstergunt, & acrimoni-
am obtundunt. Facta sic præparatione & correctio-
ne materiæ noxiæ, ea est evacuanda. Huic indica-
tioni satisfaciunt infusa laxantia, mannata, hellebo-
rata, rhabarbarina, quorum ultimum cum virtute
laxante simul vim tonicam & roborantem possidet, id-
eoque præ reliquis commendandum: hujus census
porro sunt salia cathartica amara, imo resina Jalappæ,
Scammonium cum Oleo Amygdalar. dulcium con-
tritum, quæ vel sub forma pulveris a gran. VI. XII.
XV, vel Pilularum, vel Essentiæ propinari possunt.
Ita infusum ejusmodi etiam præparatur ex foliis Sen-
næ sine caulibus, Rhabarbaro electo, fibris Hellebo-
ri nigri & Tartaro solubili, addito quodam carmina-
tivo ad flatum discutiendos. Nec pilulæ Becheri aut
Stahlî laxantes, catarrhales, aliæque quæ in pharma-
copoliis prostant, silentio prætermittendæ sunt. E-
vacuatis tandem sordibus tonus ventriculi roboran-
dus

dusest, id quod obtinetur per Essentias stomachicas v. g. Absinthii, Cent. min. Cort. Aurant. Galangæ, Gentian. rubr. Cort. Citri, Macis, aut per infusum ex Rad. Galang. Zedoar. Zinziberis, Hb. Card. Bened. Melissæ, Origani, Menthæ crispæ; nec minoris sunt præstantiæ Extract. & Essent. Cascarillæ, Mixtura tonico-nervina Stahlii; item martialia selectiora, Tinctura martis Ludovici, pulvis stomachicus Birckmanni s. Quercetani. Externe usu veniunt sacculi aromatici calidi, ex radicibus odoratis. Angelicæ, Acori, Enulæ, Zedoariæ, Galangæ, herbis coronariis: Absinthii, Menthæ crispæ, Melissæ, Pulegii, Rutæ, Thymi, floribus Rosarum rubrarum, Spicæ, seminibus carminativis Anethi, Carvi, Anisi, cum pauxillo camphoræ remixti, aut cum Sp. V. camphorato madefacti: item balsama stomachica ex Oleo N. M. destillato vel expresso, Menthæ, Rutæ, Anethi, Absinthii & Balsamo Peruviano composita; nec non Cataplasmata, ad singulum Michaëlis & Mynsichti; Emplastra de crusta panis, de Tacamahaca, Carminativum Sylvii, quibus omnibus balsamus vitæ Hoffmannianus antefendus est. Biliosa infantum colluvies, in ipsis singultus causa, per Conchas præp. cum Antimon. Diaphoret. absorbenda, Syrupo de Cichor. cum Rhabarbaro commode educitur.

§. XXVIII.

Quandocunque singultus natales sunt, subitaneæ sudoris suppressiones, per refrigerationem, omnis cura circa transpirationis negotium versetur, ne-

F

cesse

cesse est. Hoc egregie promovent præter regimen
 calidum, decocta calida largiter assumpta, infusa Thei-
 formia ex Radicibus aperientibus & diaphoreticis,
 Angelicæ, Cichorei, Imperatoriæ, Pimp. albæ, Saf-
 saparillæ, Scorzonæræ, Valerian. Vincetoxici, &
 Herbis Agrimonix, Fumariæ, Salviæ, Scabiosæ,
 Valer. Vincetox. Floribus Bellidis min. Salviæ, Sam-
 buci. Si hæc minus placent aquæ diapnoicæ, vide-
 licet aqua Chærefol. Card. Bened. Card. Mariæ, Sca-
 biosæ, Scordii, Florum Sambuci, Ceraforum nigro-
 rum, Galegæ, cum nitro & Antimon. diaphoret. in
 usum vocantur. Non contemnendi præterea sunt
 pulveres bezoardici ex Conchis præp. vel citratis
 cum nitro & Antim. diaphoret. aut antispastici ex
 Tartaro vitriol. nitro depurat. & cinnab. aut denique
 in eundem finem Essentia Alexipharmaca cum spiri-
 tu nitri dulci anatrice combinata. Quod si insuper se-
 gnities alvi adesset, clysmate leniente solvatur. Quan-
 do medicamenta refrigerantia singultum excitarunt
 per temperantia & diapnoica succurrendum est. De-
 tur e. g. pulvis quidam ex tartaro vitriolato nitro de-
 purat. Conch. præparat. vel citrat. & Antimon. dia-
 phoret. cum decocto hordeaceo aut potu quocunque
 calido Theiformi, donec lenis transpiratio succedat.
 Qui per emetica drastica, purgantia acriora, & vene-
 na accepta producit, requirit pingua, oleosa, mu-
 cilaginosa: oleum olivarum, amygdalarum dolci-
 um, lac aut cremorem ipsius, juscula pingua ex tem-
 plo larga dosi adhibita, antequam inflammatio subo-
 riatur: & quando in casu venenoso maximum peri-
 culum

culum sic sublatum est, reliquæ miasmatis venenosi, præsertim si per contagium haustum fuerit, per Alexipharmaca temperata cum regimine diapnoico, plenarie extirpari possunt. Si serpentes (qui casus rarior) aut vermes in ventriculo habitantes, hujus affectus fabri existunt, tunc enecandi sunt & eliminandi. Prius fit per anthelmintica specificè amara, v. g. Radicem Aristolochiæ rotundæ, quæ amaritie nullis facile simplicibus cedit, Filicis, Graminis, Gentianæ utriusque, Trifolii fibrini, Zedoariæ; Herbam Absinthii, Abrotani, Alliar. Cent. min. Card. Ben. Fumariæ; Semen Santonici, Tanaceti, Muscum coralinum; in specie vero per Mercurium dulcem: posterius nulla re melius, quam per Pilulas Becheri & Stahlii, quarum §. præcedenti commemoratio facta, vel in infantibus per morsulos laxantes, ex semine Santon. mercurio dulci, resina Jalappæ & saccharo rosato compositos, peragitur. Si vero officula piscium aut aciculæ, aliaque quæ cuspide sua nocent, per incuriam devorata sunt, conveniunt modicus vini haustus, acida vegetabilia, Syrupus acetositis citri, rubi idæi, berberum &c. os vel metallum lenissime arrodentia, cum decocto avenaceo passulato aut prunato, adamenta metalli involvenda & blande excernenda.

§. XXIX.

Curatio singultus, febribus acutis superveni-
entis, non nisi æquali diaphoreses promotione ab-
solvitur, id quod diversimode fieri solet, pro circum-
stantiarum ratione in morbo primario habenda. Sic
in omni inflammatione nobiliorum viscerum, auxi-

lium unice in staseos inflammatoriæ discussione consistit, quæ si recens fuerit venæsectione, qua sanguinis nimia copia subtrahitur, oppugnanda est; interne conveniunt diaphoretica mitiora, pulveres nitrofo-temperantes cum Antimonio diaphoretico, magisterio dentis apri, & sale digestivo mixti. Porro Potiones diapnoicæ ex aquis: Scordii, Cardui Mariæ, Galegæ, Plantaginis, cum Syrupo acetositis Citri, Rubi idæi aut Saccharo perlato q. s. ad gratiam edulcoratæ; deinde emulsionem ex amygdalis dulcibus ex-corticatis, pineis, semine Cardui Mariæ, cum aqua Cerasor. nigrorum, Cinnamomi sine vino, Scorzonæ, Florum Sambuci Fl. Tiliæ præparatæ; tandem decocta ex speciebus diaphoretico-diureticis & resolventibus composita e. g. Rd. Scorzonæ. Pimpinell. albæ, Imperat. Vincetoxici Hb. Galegæ, Scordii, Scabiosæ, quæ etiam pro potu ordinario usurpari possunt. Interdum etiam si ventriculus perferre potest, profunt: Essentia Alexiph. Mixtura simplex & spiritus aciduli cum Essentia Bezoardica, quo nomine Spirit. Nitri dulcis non excludendus est. Sufficiens denique potus, attamen tepidus, in his morbis semper porrigendus, cum succo citri, aut clyffo Antimonii, vel pauxillo nitri acidulus factus. Sedandi scopo, in dolorum ferocia, cortex cascarillæ aut Massæ Pilul. de Cynoglossa granum unum vel alterum interserviunt. Externe sacculi carminativi discutientes imponi possunt, in quem finem laudantur Radix helenii, iridis Florentinæ, Levistici, Zedoariæ; Herbæ Hyssopi, Melissæ, Salviæ, Thymi, Spicæ, Lav-

ven.

vendulæ, chamomillæ vulgaris & romanæ. Contra
 vero omnia stomachica calida, acria, volatilia & opia-
 ta, purgantia & emetica maxime fugiantur. In cho-
 lera & causo materia acris-caustica corrigatur tempe-
 rantibus nitrosis, & proxime illata arrosio mitigetur,
 quod quidem licet naturæ potissimum conveniat,
 quantum in artis est potestate, tentandum per emulsi-
 va, gelatinosa &c. In colica spasmus intestinorum
 demulcendus est per enemata emollientia, lenia la-
 xantia, & carminativa externe in sacculo abdomini
 imposita, quo flatus discutiantur. Diarrhœæ & dy-
 senteriæ si suppressæ, lenissime revocandæ sunt vel
 per clysteres, vel per lenelaxans; relaxata sic alvo,
 materia reliqua corrumpens corrigenda per Essenti-
 am Alexipharmaeam aut Cort. Cascarill. in pulvere
 assumtum. In inflammationibus externis, iterum
 confert temperantium & alexipharmaeorum usus in-
 ternus, externe vero sacculorum ex speciebus pare-
 goricis, discutientibus & nervinis vino calido imbuto-
 rum. Non minus in hæmorrhoidum, podagræ & ex-
 anthematum retrocessione, temperantia & diapnoica
 cum regimine moderato valde commendantur. In
 efferis hæmorrhagiis, interne ipsis inanitionibus obex
 ponatur moderantibus & tonicis, imo in casu necessi-
 tatis lenissimis adstringentibus, (quibus tamen illico
 subjungantur decocta, ad sanguinem congrumatum
 diluendum,) externe per commodam vulneris deli-
 gationem si ex causa violenta provenerint: postea
 sanguinis jactura per alimenta euchyla, bene nutrien-
 tia refarciatur. In distorsionibus, luxationibus, fra-

sturis costarum, aut malam pectoris conformationem, repositio & consolidatio, ex Chirurgico quidem petenda foro, totam rem exhauriunt; remota enim causa, removetur effectus.

§. XXX.

Ut vero ad singultum puerperarum demum revertar, triplex causarum respectus in ejus curatione attendendus erit: quo magis enim puerperarum morbi alios dignitate antecedunt, eo circumspeditionem tractationem merentur. Si itaque a partu laborioso ortus fuerit singultus, quamprimum peperit foemina, in lectum bene calidum deferatur & abdomen latiore mantili ligetur, deinde ad dolores post partum demulcendos Tinct. Cort. Aurant. recentium cum syrupo Cort. Aurant. & Citri mixta, in aqua Melissæ exhibeatur. Post duas horas propinetur pulvis nitroso-temperans cinnabaratus, cum juscule cerevisia defæcata, aut decocto tepido ex hordeo decorticato cum passulis corinthiacis: postea ab omni frigore defendatur & quies animi & corporis ipsi concedatur. Versus noctem detur dos Pilul. Becheri vel Stahlii, quo lochia moderate promoveantur, ubique vero servetur moderatum regimen, quo diapnoë modice succedat, & sic continuetur quotidie cum pulvere & Pilulis, donec nulla amplius febris metuenda sit. Quando fluxus lochiorum nimius singultum provocat, itidem pulveres nitroso-temperantes conveniunt, sed appositis mitioribus cohibentibus & lenioribus anodynis ut. coralliatis, speciebus de Hyacintho, Croc. martis antimonii teneriori, Tinctura vitri-

vitrioli martis Ludov. M. P. de Cynoglossa, ubi quoque millefolium in infuso Theiformi solet laudari. Præterea Alexipharmaca temperata heic locum habent; nec minori cum fructu gelatinæ e rasura C. C. Ebore cum Citro, oleo amygdal. dulcium cum ovo recente & momento cinnamomi adhibentur. Ubi lochia imminuta fuerint & singultus accedit, ibi natura officii blande admonenda erit, vel per pilulas Balsamicas Stahlî genuinas in aqua fœniculi solutas, cum pulveribus antispasmodicis, junctis semper diluentibus & infusis; vel per Pilulas Becheri & Essent. Alexiph. temperatam cum pauca portione Essent. Melissæ combinatam. Quando autem lochia in totum suppressa sunt, vix unquam concedit, circumscriptio experimentis comprobata, ea directe revocare, idque eo minus, quo diutius hæc suppressio jam duravit. Convenit potius ad causas ejusdem respicere, præcipue vero orgasmum sanguinis & æstum febrilem per pulveres febriles, ex sale medio, nitro Antim. diaphoret. & conch. præparatis aut citrat. contemperare, & per potiones diapnoicas ex aquis destillatis: Plantag. Card. Ben. Fl. Sambuc. Scabios. Ulmar. modicum provocare sudorem, eumque per decocta & infusa, quibus spissa qualitas sanguinis una tollitur, continuare. In Plethoricis per V. S. in pede, sanguinis copia imminuenda, & alvus libera semper conservanda est. Quod si omnino huic suppressioni febris acuta inflammatoria supervenerit cum notabili singultu, ea, ut alia inflammationes nobiliorum viscerum, de quibus §. præcedenti sermo fuit, est tractanda. Nec diu
com-

commorandum, si secundinarum retentio suspecta, sed illico per hepar anguillæ expellendæ: sic etiam in terrore & iracundia, congruis absorbentibus & corrigentibus, bilis acrioris damna mox avertenda sunt.

§. XXXI.

Et hæc sunt potiora, quæ circa singultum puerperarum observanda & annotanda veniunt. Utut enim & aliis puerperarum affectibus ille accedere queat, de cujus vel cura vel præservatione aliquid dicendum fuisset; hæc tamen ita comparata sunt, ut nihil vel parum difficultatis ostendant. Accedit quod limites speciminis Academici, tam diffuse pertractare omnia, minime permittant. Quapropter summo Numini pro clementer concessis, in hoc labore viribus, gratias ago humillimas, nihilque magis in votis habeo, quam ut hæc & alia quæ conabor, in nominis sui Celsissimi gloriam & proximi veram salutem vergere sinat ipse, qui est omnium rerum autor, initium &

F I N I S.



Sonnet.

S Er Fleiß wird doch gekrönt, und der insonderheit,
Der unsre Lehr-Begier bey Buch und Kiel bezeuget,
Und unser Ohr aufs Wort gelehrter Männer neiget.

Wer seine Kraft einmahl den Wissenschaften weihet,
Der Klugheit Leitung folgt und denn mit Emsigkeit
Und einen festen Tritt auf iene Höhen steiget,
Woselbst die Weisheit uns die Kränck' ums Haupt-Haar beuget,

Der wird gewiß mit Glück und Ehr und Lust erfreut.
Seht unsern **HERRN G** an, wie den sein Fleiß erhebet!
Du hast Dich, Werther Freund, von Jugend auf bestrebet,

Ein recht geschicktes Theil der besten Welt zu seyn.
Jetzt erntet Dein Bemühn die schönsten Früchte ein.
Genieße sie vergnügt, genieße sie fein lange,
Damit die Welt von Dir viel Nutz und Heil empfangen.

Hiemit wolte dem Hoch-Edlen und Hochgelahr-
ten Herrn *Doctorando* seine gehorsamste Auf-
wartung machen

Enno Friederich Kempe,

aus Ost-Frießland der Gottes-Gelahrheit Beflissener.

S Als ist der Grund der stillen Lust, die man an allen
Freunden siehet?

S Was ist es das ihr treues Hertz so starck und reizend
an sich ziehet?

Warum ist wer die Tugend ehret, so emsig, munter und bereit?
Was blizt aus unsrer Mäusen-Augen für wohl gesetzte Freund-
lichkeit?

G

Warum

Warum wird ein so froh' Gerausch bald hier, bald da, bald
dort versüret?
Für wen gehört der Lorbeer-Cranz, den Phöbus in den Hän-
den führet?
Nur still! Er ruft: was darf man fragen! Mein Hertzog,
mein gelehrter Sohn,
Trägt für Sein rühmliches Bemühen, den längst verdien-
ten Lohn davon.

Diese wenige Zeilen setzte zum Zeichen seiner aufrich-
tigsten Ergebenheit mit bey, des Herrn Do-
ctoranden gehorsam-verbundenster Diener,

Johann Friedrich Junius,
Greiza-Varisc.

EXigit officium, specimen conscribere amoris
Solemni hocce die, suavis AMICE TIBI.
Fertilis ast verbis hic Virgilius sit, oportet.
Qui TE promerita tangere laude cupit.
Frugibus infelix merito mea Musa veretur.
Ne, cum TE laudat, detrahat ipsa TIBI.
Siue TVOS spectro mores, sunt lumina magna,
Omnibus exempla non imitabile eris.
Siue TVAM intuear doctrinam, & in arte salubri
Vires TV maior redderis vsque mihi.
Felix, quæ talem genuisti patria, prolem!
Felix TV quoque, quem munera magna ma-
nent!

*Hisce PRÆNOBILISSIMO DOMINO DOCTO-
RANDO, Amico per plures annos integerrimo,
felicem studiorum decursum gratulari voluit*

Enno Rudolph Muller, Med. Cult.
Gesaltz

Salkne Thränen haltet ein!
Der Abschied ist genug beweinet:
Heut will und muß ich frölich seyn;
Weil Hertzogs Glücks-Stern heiter scheint.
Ja Theurer Freund! den Witz und Geist,
Und Tugend, und was edel heist,
Weit mehr als alle Tittel zieren;
Hygaa schmückt Dein würdig Haupt,
Drum ist mir Wunsch und Trieb erlaubt,
Drum soll diß Blat Dir gratuliren.

Schau her! hier ist die Dankbarkeit
Für alle seltne Freundschafts-Proben
Für Deine Treu, die jederzeit
Dein wahres Lob noch mehr erhoben.
Diß alles raubt der trübe Tag,
An den ich nicht gedencken mag,
Weil er mir alle Freude wehret;
Doch wohl! er raube mir die Lust
Dein Bildniß ruht in meiner Brust,
Der Liebe Band bleibt unverfehret.

Ich schweige still, denn diß Pappier
Kan mein Verlangen doch nicht fassen:
Zeug hin! der Höchste geht mit Dir,
Sein Segen wird Dich nie verlassen,
Die Vorsicht winckt, die Weisheit spricht:
Komm ächter Sohn! es soll Dir nicht
An Glück und Ruhm und Wachsthum fehlen.
Der Krancke hörts und sehnet sich,
Und seuffzt: mein Hertzog sah ich Dich!
Komm Komm! ich will die Stunden zehlen.

Durch gegenwärtige Zeilen wolte dem Herrn Do.
Horando seine verbindlichste Ergebenheit bezeugen

W. J. J. Walter,
Med. Cult. Oppon.

Ster muß selbst Podalir, Dir einen Lorbeer winden
Den er Dir nach Verdienst schon längst geweyhet
hat.

Darff ich denn Werthester mich auch mit ihm verbinden?
Sind denn mein schlechter Kiel mit seinen Wünschen statt?

So werde ich demnach Dir einen Altar setzen
Und meiner Pflicht gemäß mich auf die Würde freun
Womit Hygäa sucht Dich Werther! zu ergözen.
Ich will mit andern auch Dir meine Blumen streun.

So lebe dann vergnügt, der Himmel lasse Segen
Ben Deiner Heilungs-Kunst auf allen Seiten ruhn.

Er cröne Dich mit Wohl auf allen Deinen Wegen,
So ist Dein Stand beglückt; so weist Dir Dein Thun

Wie Du kanst recht vergnügt in späte Jahre leben,
Doch bitte dann darben, wenn Deine Liebe kan

Mir Deinem treuen Freund auch eine Gunst vergeben
So setz ich mich hiemit Dir sehr verbindlich an.

L. A. Adeling,

Sil. Wrat. Med. Cult.

